

«Утверждаю»

ИП «FishAsia»

_____ Г.И. Воевутко

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Разработка научной рекомендации для ведения рыбоводства (аквакультуры) – озерно-товарное рыбное хозяйство (ОТРХ) на водоемах: озеро Сарыбалык Тайыншинского, озеро Жантайсор Акжарского районов Северо-Казахстанской области

Основание: Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использованию животного мира» ст.27, Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 27 Об утверждении Правил перевода рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, закрепленных для ведения промыслового рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для ведения рыбоводства (аквакультуры).

Директор
ТОО «АРЕКЕТ-2050»

Ответственный исполнитель
ихтиолог-рыбовод



Е. Муканов

Д. Имашева

Приложение: Свидетельство об аккредитации МОН РК от 15.01.2021 г.
Серия МК № 000014.

Кокшетау 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

1. Развитие аквакультуры в Северо-Казахстанской области
2. Методы исследований среды обитания рыб, включая гидрологические, гидрохимические параметры водоемов, разнообразие низших гидробионтов и кормовой базы рыбохозяйственного водоема.
3. Характеристика рыбохозяйственных водоемов
 - 3.1. озеро Сарыбалык
 - 3.2. озеро Жантайсор
4. Реконструкция ихтиофауны (зарыбление рыбопосадочным материалом и прогноз ежегодной проектной мощности водоемов)
 - 4.1. Определение запасов малоценных видов рыб
5. Схема функционирования озерно-товарного рыбоводного хозяйства
6. Рекомендуемые добавочные виды рыбы для повышения продуктивности и применения в целях мелиорации водоема
7. Определение наиболее эффективного направления деятельности
8. Календарный план работы ОТРХ
9. Рекомендации по рыбоводно-мелиоративным, охранным и воспроизводственным мероприятиям
10. Дополнительные направления деятельности
11. Техническое оснащение и его модернизация
12. Рыболовный флот и организация промысла
13. Возможные риски при функционировании ОТРХ
14. Охрана окружающей среды и мероприятия биологической безопасности
15. Охрана водоема

Заключение

Приложение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Согласно пп.1-8 ст.27; п.10 ст.10; пп.77-10 ст.9 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», от 28 октября 2019 года № 268-VI пользователи животным миром при специальном пользовании имеют право перевода закрепленных за ними рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для ведения промыслового рыболовства в рыбохозяйственные водоемы и (или) их участки для ведения рыбоводства (аквакультуры).

Для ведения рыбоводства (аквакультуры) используются: обособленные (изолированные) водоемы (или) участки, населенные преимущественно малоценными видами рыб и имеющие низкую естественную рыбопродуктивность, небольшие озера и водохранилища, другие изолированные водоемы местного значения. Озерно-товарное рыбоводное хозяйство (далее – ОТРХ) – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных в полувольных контролируемых условиях путем полной или частичной замены ихтиофауны в естественных и искусственных водоемах;

Субъект рыбного хозяйства переводит рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, закрепленные для ведения промыслового рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для ведения рыбоводства (аквакультуры), при наличии биологического обоснования аккредитованной научной организации в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Пользователи животным миром при специальном пользовании обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
- 2) проводить ежегодный учет численности используемых объектов животного мира и представлять отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 3) проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов животного мира в соответствии с планами развития субъектов рыбного хозяйства;
- 4) по согласованию с уполномоченным органом на основании биологического обоснования производить рыбохозяйственную мелиорацию на закрепленном рыбохозяйственном водоеме и (или) участке, ежегодную корректировку данных промыслового запаса рыбных ресурсов и других водных животных;
- 5) в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, представлять ему сведения о вылове рыбных ресурсов и других водных

животных, промысловой обстановке на водоеме, выданных путевках согласно формам, утвержденным уполномоченным органом;

Рыбы и другие водные животные, выращенные в ОТРХ, являются собственностью субъекта рыбного хозяйства.

Цель исследований: Разработка научной рекомендации: оценка основных параметров водной среды, видового состава и современного состояния популяций рыб и кормовых организмов; в работе даны биологические характеристики обитающих рыб: размерный, линейный и весовой темп роста.

Рекомендованы объемы зарыбления основными промысловыми рыбами, определена ежегодная проектная мощность водоемов на период 2023–2027 гг.

В целях увеличения объема выращивания товарной рыбы рекомендован мелиоративный отлов малоценной аборигенной рыбы. Даны рекомендации по рациональному ведению рыбоводства в условиях рыбоводства (ОТРХ) и наиболее эффективного направления хозяйственной деятельности на водоемах.

1. РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории области в настоящее время рыбная отрасль развивается по экстенсивному пути, в результате чего значительную долю в уловах составляют малоценные виды, в частности наиболее распространенные золотой и серебряный караси, плотва, окунь, а также лещ.

Рыбные хозяйства в большинстве своем специализируются на выращивании карася и заморозостойких видов рыб, об этом свидетельствуют статистические данные по вылову рыбы. Это объясняется не прихотливостью данных популяции к условиям обитания, и как следствие достаточно низким уровнем затрат на организацию таких хозяйств. Все мероприятия сводятся к очистке водоема от водной растительности и переселению аборигенных видов из других водоемов для улучшения качественных характеристик популяции. Ведению более интенсивного рыбного хозяйства на многих водоемах препятствуют особенности водных объектов.

В области находится множество рыбохозяйственных водоемов, на которых ведется товарное выращивание карпа, сиговых, щуки и других ценных видов рыб. Эти рыбные хозяйства требуют значительно больших затрат, помимо затрат на мелиоративные работы, сюда добавляются затраты на приобретение посадочного материала на рыбопитомниках, а в отдельных случаях и на подращивание личинок рыб до подрощенной молоди или сеголеток. Однако следует отметить, что и доходность от рационально организованных хозяйств значительно выше, чем в первом случае. Рыбоводные хозяйства, выращивающие ценные виды рыб до товарной навески в зависимости от периода выращивания можно разделить на хозяйства с однолетним выращиванием и с многолетним выращиванием.

Рыбоводные хозяйства с однолетним выращиванием основываются на выращивании товарной пеляди и других сиговых видов рыб. Эти хозяйства наиболее успешно функционируют на солоноватых водоемах, так как из-за высокой минерализации в водоемах отсутствует аборигенная ихтиофауна, меньше врагов и паразитов рыб, а также они являются более продуктивными по кормовой базе.

Рыбоводные хозяйства с многолетним выращиванием основываются на выращивании большего разнообразия ценных видов рыб. При вселении в водоем посадочного материала необходимо учитывать: возможности водоема по кормовой базе, пищевые пристрастия рыб, чтобы избежать конкуренции, пригодность гидрологического и гидрохимического режима водоема для обитания того или иного вида.

Озерно-товарное рыбное хозяйства организовываются на базе естественных водоемов, поэтому капитальные затраты по подготовке их к эксплуатации относительно невелики. Основными объектами разведения в озерных хозяйствах наиболее предпочтительны карп, форели и сиговые виды, возможно также в форме поликультуры выращивание растительно-

ядных рыб, судака и некоторых других объектов товарного выращивания, например карася, линя, и щуки.

Основной целью ОТРХ должно быть улучшение качественного состава ихтиофауны и вместо обитающих в озерах малоценных, тугорослых рыб вырастить биологически ценные высокопродуктивные виды.

Водоемы с глубинами более 3,5 метров и благоприятным гидрохимическим режимом могут быть использованы для многолетнего выращивания, а мелководные – для выращивания сеголеток или однолетнего выращивания товарной рыбы, в частности для северного региона в первом случае карпа и растительноядных рыб, а во втором – сиговых.

В мелководных заморных водоемах возможно только однолетнее выращивание рыбы с интенсивным отловом ее в осенне-зимний период. В периодически заморных водоемах можно проводить многолетнее выращивание, однако, в случае возникновения заморной ситуации необходимо осуществлять аэрацию, а при невозможности спасти рыбу от гибели во время замора – максимально изымать ее из водоема.

Выращивать рыбу можно в монокультуре и поликультуре. При монокультуре водоем зарыбляется только одним видом (рекомендуется для заморных водоемов); при поликультуре – выращивается одновременно несколько видов рыб (рекомендуется для периодически заморных и незаморных водоемов). Естественно, для рационального ведения рыбного хозяйства целесообразно выращивать несколько видов рыб, различающихся по характеру питания и местам обитания. Например: пелядь, рипус, ряпушка питаются преимущественно зоопланктоном, а карп и сиг – зообентосом. Сиговые очень слабо используют запасы кормов в прибрежной (особенно в зарослевой) зоне, а для карпа это излюбленные места обитания.

В некоторых случаях при выращивании карпа применяют его подкормку. Неиспользованные остатки корма способствуют развитию зоопланктона, который служит для сиговых пород основной пищей.

В зависимости от характера выращивания и имеющихся возможностей в приобретении посадочного материала используют личинок, сеголеток, годовиков, двухлеток рыб.

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ РЫБ, ВКЛЮЧАЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДОЕМОВ, РАЗНООБРАЗИЕ НИЗШИХ ГИДРОБИОНТОВ И КОРМОВОЙ БАЗЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОЕМА.

При изучении гидрологического режима, морфометрические параметры определялись на основе космических снимков и визуального осмотра водоемов и водосборной площади. Помимо этого, осуществлялись промеры глубин в разрезе по наибольшей ширине и длине.

Гидрохимические пробы отбирались по сетке станций, как у поверхности воды, так и у дна с последующей фиксацией и обработкой в

лабораторных условиях по существующим методикам. Химический анализ проводился по следующим ингредиентам: ионный состав, общая минерализация, общая жесткость, водородный показатель, газовый режим (кислород и двуокись углерода), содержание биогенов (аммоний, нитраты, нитриты и фосфаты), а также БПК и перманганатная окисляемость.

Материал по зоопланктону на водоемах собирался отцеживанием 100 л воды через планктонную сеть Апштейна. В сетях использовался мельничный газ № 55 и 70. Фиксация проб проводилась 4 % раствором формалина. Идентификация организмов проводилась по известным определителям. Просчёт организмов под микроскопом вёлся в определённой части пробы, с последующим просмотром половины её объёма или всего остатка для выявления крупных и редких особей. При расчётах индивидуального веса зоопланктёров применялись уравнения линейно-весовой зависимости. Для каждого вида ракообразных суммировалась численность и масса всех стадий развития. Далее суммировались количество особей и весовой показатель всех видов по основным группам организмов и сообщества в целом. Численность и масса зоопланктона рассчитывались на 1 м³ водной толщи.

Сборы бентоса проводились дночерпателем Петерсена с площадью захвата 1/40 м². Отобранный грунт тщательно промывался через промывочную сеть, выполненную из газа № 40. После чего, гидробионтов выбирали пинцетом, помещали в пенициллиновые флаконы и фиксировали 4% раствором формалина. Обработка их велась по общепринятым методикам. При определении видового состава бентосных организмов использовались общеизвестные определители.

Расчет численности и промзапаса проводился по стандартной методике сетепостановок. За основу была принята формула:

$$N = \frac{Q * S}{k},$$

где: Q- количество рыб в контрольных уловах в шт., S- учетная площадь водоема в га, получаемая вычлениением непригодной для промысла зоны (заросли надводной растительности, большие глубины и т.д.) из общей площади водоема, k- поправочный коэффициент, получаемый перемножением трех основных коэффициентов для каждой размерной группы (сети):

$$k_i = P * K * C,$$

где: P- коэффициент вероятности встречи рыбы с орудиями лова K- коэффициент уловистости сетей, C- площадь облова контрольного орудия лова. Данные коэффициенты вычисляются на основе экспериментальных данных.

Коэффициент P вычисляется на основании формулы, предложенной Ю.Т.Сечиным, усреднено он составил 0,025. Коэффициент уловистости сетей принят равным 0,5.

Площадь облова рассчитывалась по формуле:

$$C = V * t * g * (2 * b + 3,14 * V * t)$$

где: V- радиальная скорость рыскания, индивидуальная для вида (м\мин.), t- время сетепостановки в мин., g- количество поставленных сетей, b- длина сети при стандартной длине в 25 м.

В данном случае основное значение имеет показатель V. Он был заимствован из справочника. Скорости рыскания для карася, окуня и щука составляют 0,04, для леща и плотвы- 0,05, для карпа- 0,06, для линя- 0,10 м/с.

Отдельные расчеты производились для каждой сети, которые в последствии суммировались в единую численность и промзапас.

Промзапас рассчитывалась по следующей формуле:

$$M = N * t,$$

где M - ихтиомасса возраст\популяции, N - численность возраста\популяции, определенная по формуле, t - средняя навеска особей в возрасте\популяции.

Коэффициенты изъятия определялись в соответствии с возрастом вступления самок популяции в стадию половой зрелости.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ

3.1. Озеро Сарыбалык



№№ п/п	Название водоемов	Общая площадь, га	Степень зарастания, %	Полезная площадь, га	Место- расположение (район)
1	оз. Сарыбалык	130	50	65	Тайыншинский

Гидрологический режим

Координаты 54°26'40.60"с.ш., 70°44'52.47"в.д. Водоем расположен в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области в 4,5 км к юго

западнее от села Майбалык. Питание водоема осуществляется за счет атмосферных осадков и талых вод. Общая площадь 130 га, длина 1,6 км, ширина 1,1 км. Максимальная глубина 2,2 м, средняя глубина 1,5 м. Донные отложения, представленные темными илами, достигают мощности в 20-40 см.

Гидрохимический режим

Минерализация воды колеблется в пределах от 530 до 850 мг/л. Это связано с колебанием уровня воды по сезонам. Активная реакция среды (рН) колеблется в пределах от 7,35 до 8,3, что характеризует водную среду как слабо щелочную. Содержание растворенного в водоеме кислорода колеблется в пределах от 9,19 до 9,4 мг/л, что характеризуется как среда благоприятная для развития гидробионтов.

Содержание органических веществ не превышает предельно-допускаемую концентрацию, установленную для рыбохозяйственных водоемов. Сухой остаток равен 365 мг/л. По биогенным элементам, пестицидам, токсическим элементам состав воды находится в пределах ПДК.

Гидробиология

Зоопланктон однообразен и включает широко распространенные речные виды планктонных беспозвоночных, в том числе виды коловраток, ветвистоусые. Численность зоопланктона колеблется от 40 до 60 тыс. экз./м³, биомасса в руслах от 0,7 до 0,8 г /м³. Зообентос представлен олигохетами, моллюсками, водными клопами, жуками, клещами. По биомассе в пробах также доминируют дафнии, они составляют 60% от общей массы зоопланктона. Общая численность планктонных организмов составляет - 126 тыс.экз./м³. Общая биомасса зоопланктона 5,0 г/м³. По развитию зоопланктона относится к средnekормным водоемам. Зообентос водоема в пробах представлен личинками хирономида, насекомых, малощетинковыми червями и пиявками. Общая численность бентосных организмов составляет 150 экз./м², а биомасса равна 3 г/м².

Водная растительность

Озеро окружено, в виде полос шириной 50 метров, жесткой растительностью, представленной преимущественно тростником, камышом озерным, тянущимся вдоль береговой линии. Тип зарастания – бордюрный. Степень зарастаемости водоема водной растительностью средняя и составляет 50 % от всей площади водоема. Среди погруженных растений ведущее место в зарастании озер принадлежит сине-зелеными водорослям и различным видам рдеста. Сообщества жесткой надводной растительности особенно развиты на глубинах 0,6- 1,0 м.

Ихтиофауна

Структура рыбного сообщества состоит из карася, линя, ротана.

Таблица 1. – Гидрохимические показатели воды

Таблица 1. Гидрохимические показатели воды								
pH	Растворенные газы, мг/дм3		Биогенные соединения, мг/дм3				Органическое вещество, мг/дм3	Минерализация, мг/л
	CO2	O2	NH4	NO2	NO3	PPO4		
7,5	-	9,2	0,51	<0,4	0,03	<0,05	<0,36	0,5
Жесткость общая, мг-экв/дм3		Основные ионы						
		Na++K+	Ca+2	Mg+2	Cl-	SO3-2	HCO3-	
5,1		587	82	95	864	403	256	

Таблица 2 – Характеристика видового состава ихтиофауны

Наименование			Характеристика	Состояние популяций в водоеме
Казахское	Русское	Латинское		
Семейство Карповые Cyprinidae				
Қарабалық	Линь	<i>Tinca tinca</i> (L., 1758)	Промысловый, аборигенный	малочисленный
Кәмдігі мөңке	Карась серебряный	<i>C. gibelio</i> (Bloch, 1782)	Промысловый, аборигенный	массовый

3.2. Озеро Жантайсор



№№ п/п	Название водоемов	Общая площадь, га	Степень зарастания, %	Полезная площадь, га	Место-расположение (район)
1	оз. Жантайсор	340	60	136	Акжарский

Гидрологический режим

Координаты 52°53'05.42"с.ш., 66°37'94.40"в.д. Водоем расположен в Акжарском районе Северо-Казахстанской области в 7 км к юго западнее от села Талшик. Питание водоема осуществляется за счет атмосферных осадков и талых вод. Общая площадь 340 га, длина 2,3 км, ширина 1,5 км. Максимальная глубина 2,8 м, средняя глубина 1,8 м. Донные отложения, представленные темными илами, достигают мощности в 20-30 см.

Гидрохимический режим

Общая минерализация воды составляет 0,5 мг/л. Активная реакция среды (рН) щелочная и находится в пределах от 7,0 до 7,5. Показатель жесткости воды составляет 5,1 мг-экв./л. Содержание органических веществ не превышает предельно-допустимую концентрацию установленную для рыбохозяйственных водоемов. Содержание основных химических элементов находится в пределах нормы. Сухой остаток равен 572 мг/л. Прозрачность воды составляет 1,3 м.

Гидробиология

Зоопланктон представлен коловратками, веслоногими и ветвистоусыми ракообразными. Биомасса зоопланктона водоема 2018,1 мг/м³, это свидетельствует о средне кормности водоема. Донные население озера включает брюхоногих моллюсков, личинки ручейников, водяные клопы, бокоплавы, личинки мотыля и олигохет. Численность и биомасса основных групп зообентоса 585 экз/м² и 2,8 г/м² соответственно.

Водная растительность

Озеро в незначительной степени заросло жесткой водной растительностью (тростником, камышом, рогозом) и мягкой водной растительностью (рдестом гребенчатым, рдестом малым, урутью). Степень зарастания около 5%.

Ихтиофауна

Структура рыбного сообщества состоит из следующих видов: карась, окунь, щука.

Таблица 1. – Гидрохимические показатели воды

рН	Растворенные газы, мг/дм ³		Биогенные соединения, мг/дм ³				Органическое вещество, мг/дм ³	Минерализация, мг/л
	CO ₂	O ₂	NH ₄	NO ₂	NO ₃	PPO ₄		
7,5	-	8,5	0,7	<0,2	0,4	<0,03	<0,5	0,5

Жесткость общая, мг-экв/дм ³	Основные ионы					
	Na++K+	Ca+2	Mg+2	Cl-	SO ₃ -2	HCO ₃ -
5,1	387	82	91	634	285	262

Таблица 2 – Характеристика видового состава ихтиофауны

Наименование			Характеристика	Состояние популяций в водоеме
Казахское	Русское	Латинское		
Семейство Карповые Cyprinidae				
Кәмдігі мөңке	Карась серебряный	<i>C. gibelio</i> (Bloch, 1782)	Промысловый, аборигенный	массовый

4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИХТИОФАУНЫ

Ихтиофауна водоема в настоящее время представлена несколькими видами. В составе ихтиофауны присутствует малопродуктивные виды с низким темпом роста. Если проводить реконструкцию водоема в целом, т.е. проводить интенсивное зарыбление продуктивными видами рыб: карп, сиговыми, растительноядными и, помимо этого, сохранить местные аборигенные заморостойкие популяции, такие как плова, карась, то можно значительно поднять рыбопродуктивность водоема, сократить сроки выращивания и как следствие сэкономить на сопутствующих расходах.

Влияние объектов вселения на экосистему водоемов может быть прямым и опосредованным. К прямому воздействию можно отнести потребления кормовых объектов экосистемы (растительность, зоопланктон, зообентос и ихтиофауна). К опосредованному воздействию можно отнести влияние на экосистему в результате снижения численности отдельных организмов (пищевая конкуренция, улучшение или ухудшение среды обитания и т.д.).

В целях увеличения эффективности использования организмов зообентоса, предлагается к вселению бентофаг – карп. Данный вид, при соблюдении нормативов зарыбления, не окажет негативного влияния на биоценозы.

Исходя из выше изложенного следует, что при соблюдении всех технологических процессов и объемов вселения влияние на биоценоз от товарного выращивания карпа, будет минимальным. Помимо этого увеличение производства рыбной продукции за счет естественной кормовой базы приведет к снижению содержания органических веществ в водоеме (они будут изыматься в виде рыбы, потребляющей зоопланктон, зообентос и растительность, которые в результате естественной гибели увеличивали содержание органики), что приведет к улучшению среды обитания.

Виды рыб предлагаемые для товарного выращивания способствуют повышению продуктивности водоема, улучшению качественного состава ихтиофауны в озерно-товарном рыбоводном хозяйстве на базе рыбохозяйственных водоемов

Проведение работ по реконструкции ихтиофауны в целях внедрения озерного товарного рыбного хозяйства позволит:

1. Сократить сроки выращивания рыб до товарной навески;

2. Улучшить качественный состав ихтиофауны, за счет замены малоценных видов рыб на более ценные, в экономическом отношении;
3. Увеличить эффективность использования кормовых ресурсов водоемов;
4. Увеличить объемы добычи рыбных ресурсов;
5. Повысить привлекательность водоемов для спортивно-любительского рыболовства и рыболовного туризма;
6. Повысить экономическую эффективность эксплуатации водоема.

Таблица 3. Схема реконструкции ихтиофауны ОТРХ

№№ п/п	Название водоемов	Состав ихтиофауны в настоящий момент	Состав ихтиофауны после реконструкции
1	оз. Сарыбалык	карась, линь, ротан	карп, растительноядные, сиговые, линь
2	оз. Жантайсор	карась	карп, сиговые, растительноядные

Таблица 4. Ежегодное зарыбление рыбопосадочным материалом

№	Водоемы	Ежегодные объемы зарыбления, шт.			
		карп (сегол.)	сиговые (личинки)	р/ядные (сегол.)	всего, шт.
1	оз. Сарыбалык	16250	500000	6500	522750
2	оз. Жантайсор	15000	800000	13600	828600

Таблица 5. Объемы ежегодного выращивания товарной рыбы (тн)

№ п/п	Наименование водоемов	Годы					Всего, тн
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	оз. Сарыбалык	13,8	15,2	16,7	18,4	20,2	84,3
2	оз. Жантайсор	18	19,8	21,8	24,0	26,4	109,9

4.1. Определение запасов малоценных видов рыб

Оценка запасов малоценной аборигенной рыбы и определение объемов изъятия на исследованных водоемах проводилось по методике для пассивных орудий лова. Коэффициент изъятия определен в среднем как 0,3. Также при определении объемов изъятия учитывались морфометрические характеристики водоемов, биологические особенности рыб и результаты постановок контрольных сетей.

Объем изъятия на водоемах может изменяться по ряду причин природного происхождения (маловодные годы, заморы и т.д.) и

антропогенного происхождения (попадание ядовитых веществ в водоем и как следствие гибель ихтиофауны, проведение акклиматизационных работ, и т.д.).

Оценка промысловой численности и биомассы рыб, определение рекомендуемого объема изъятия малоценной аборигенной рыбы проводились по методике для пассивных орудий лова. Расчет велся по формуле:

$$N=QS/СКР$$

N – численность или биомасса, тыс. шт./тонны;

Q – средняя численность или биомасса по данным улова, шт.;

S – площадь водоема на период исследований, га;

С – площадь облова (га), определяющаяся с учетом всего количества применяемых сетей для учета промысловых запасов (площадь облова одной стандартной сети длиной 25 м и высотой 2 м составляет 2,8 га);

К – коэффициент уловистости применяемых нами сетей составил 0,5;

P – вероятность попадания рыбы в сеть, из-за угла атаки, для сазана, карася, язя – 0,024.

Принцип, положенный в основу этого метода, основан на представлении, что колебания уловов соответствуют колебаниям численности и биомассы стада и что изъятие компенсируется пополнением.

Таблица 6. Рекомендуемый объем изъятия малоценной аборигенной рыбы

Показатель		Длина сети, м	Кол-во сетей, шт.	S обл ова, га	Коэфф. уловист.	Вероят. попа- дания	Ср. навеска, кг	Числен., тыс. шт.	Рекомендуем ый объем изъятия, тн
Водоем	вид рыб								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Тайыншинский район									
озеро Сары- балык	карась	25	8	2,8	0,5	0,024	0,2	2,5	5,00
	линь	25	8	2,8	0,5	0,024	0,25	1,3	3,20
	ротан	25	8	2,8	0,5	0,024	0,23	1,2	3,60
Акжарский район									
озеро Жантай- сор	карась	25	8	2,8	0,5	0,024	0,25	3,2	8,00

В целях увеличения объема выращивания товарной рыбы в данных водоемах необходимо произвести мелиоративный отлов малоценной аборигенной рыбы, который создает дополнительную нагрузку на кормовую базу водоема и мешает отлову ценных видов. Отлов необходимо произвести в течении первых двух лет разрешенными промысловыми орудиями лова.

Таким образом, вылов рекомендуемый к изъятию на водоеме: озеро Сарыбалык: карась – 5 тн; линь – 3,2 тн; ротан – 3,6 тн.

На озере Жантайсор: карась – 8 тн.

5. СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЗЕРНО-ТОВАРНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Данные водоемы будут использоваться в целях внедрения аквакультуры. Здесь в первые годы будут выращиваться карп, растительноядные, акклиматизированные интродукционные и аборигенные виды рыбы, а также в перспективе сиговые виды рыб. Основное направление деятельности – товарное выращивание промысловой рыбы, организация спортивно-любительского рыболовства и развитие рыболовного туризма, дополнительная деятельность – промысел с целью реализации рыбы в свежем виде, либо для дальнейшей переработки.

Таблица -6. Основные технологические процессы функционирования ОТРХ

Технологический процесс	Сроки
Приобретение личинки карпа, гибриды карпакарась, растительноядных видов рыб и сиговые личинки на рыбопитомнике, зарыбление водоемов	май-июнь
Кормление карпа и выращивание товарной продукции	май-октябрь
Отлов товарной продукции и реализация рыбы	октябрь-ноябрь
Проведение биотехнических мероприятий и проведение мелиоративных работ	в течении года

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОБАВОЧНЫЕ ВИДЫ ИХТИОФАУНЫ, В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ВОДОЕМА И ПРОВЕДЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ




Карп - наиболее ценный вид среди объектов товарного выращивания, акклиматизированный в свое время во многие водоемы Костанайской области, его численность, кроме естественного воспроизводства, поддерживается периодическим вселением в озера молоди, получаемой на рыбопитомниках. Карп – крупная рыба, в некоторых озерах встречаются особи длиной от 50-60 см до 4-5 кг, иногда вылавливаются экземпляры до 7-8 кг и выше. Растет он очень хорошо и за лето прибавляет в весе до 1 кг.




Золотой карась – обычный и широко распространенный в водоемах Костанайской области вид, обитающий, как правило, вместе с серебряным. Золотой карась, как и серебряный, наименее требователен к кислородному режиму водоемов, поэтому они выживают в мелководных озерах, где другие виды рыб погибают от зимних заморов. Это и является основной причиной их широкого распространения и высокой численности в водоемах.



Серебряный карась – наиболее распространенный вид в водоемах области. Из-за низкой требовательности к кислородному режиму заселяет большую часть водоемов Костанайской области. Может зимовать, как и золотой карась, в промерзающих до дна водоемах, однако для этого должен быть достаточно мощный слой ила, зарывшись в который они переживают неблагоприятные условия. В контрольных уловах встречается практически во всех водоемах области



Пелядь - относится к наиболее перспективным объектам озерного рыбоводства. Ее родина – реки и некоторые глубокие озера Сибири. Различают озерную и речную формы. Озерная пелядь более высокотелая по сравнению с речной и отличается повышенным темпом роста. Пелядь нерестится в октябре-ноябре на песчано-каменистых грунтах; Питается организмами зоопланктона, но при их недостатке легко переходят на питание бентосом. Оптимальный режим нагула происходит при температуре воды 15-20 °С. При нормальной плотности посадки сеголетки пеляди достигают в октябре-ноябре навески 120 - 130 г, двухлетки – 250 - 300 г. Половой зрелости достигает на третьем году жизни. Плодовитость пеляди составляет в среднем 44 тыс. икринок (колеблется от 30 - 100 тыс. шт.). Инкубационный период длится 170-180 суток. Выклев личинок в апреле - мае. Желточный мешок рассасывается на 3-5 сутки, и после этого личинки переходят на активное питание. Наиболее перспективный объект товарного выращивания, обладающий высокими гастрономическими достоинствами




Белый амур - отличается быстрым ростом. В бассейне Амура достигает длины 1,2 м при массе 32 кг, становится половозрелым в возрасте 9-10 лет и при длине 68-75 см. Южнее (в реках Китая) созревает на 1-2 года раньше. Плодовитость в Амуре в среднем 800 тыс. шт. икринок. В Амуре размножается в июне-июле единовременно, южнее (в реках Китая) нерест порционный с апреля по август.

Питается белый амур преимущественно высшей водной растительностью, интенсивно поедая молодую осоку, хвощ, ряску, рдест, элодею, водяную гречиху и другие растения, которыми может зарастать водоем.

Способность белого амура потреблять жесткую и мягкую водную растительность используется при биологической очистке водоемов для борьбы с зарастанием. Одна тысяча двухгодовиков массой около 200 г способна очистить канал площадью 3-5 га на протяжении 5-10 км. При этом

осенью из них получают ценную рыбную продукцию. В сибирских условиях, несмотря на меньший темп роста, чем в южных регионах страны, белый амур является прекрасным мелиоратором, очищающим водоем от избытка водной растительности.

Для получения 1 кг прироста ему требуется потребить 20-40 кг растений.




Белый толстолобик - распространен в водах Китая и бассейне Амура. Крупная рыба – до 1 м длины и свыше 10 кг массы тела. Имеет высокую скорость роста. Толстолобики отличаются от других карповых рыб особым устройством жабер, которые образуют своеобразную сетку, что позволяет отфильтровывать мелкие водоросли. Кишечник у взрослых особей очень длинный, в 15 раз длиннее тела.

Половозрелыми становятся на юге в три года жизни, а на Амуре не ранее 5 лет. Молодь после рассасывания желточного мешка питается зоопланктоном, затем при достижении длины тела 1,5 см переходит на питание фитопланктоном.

Важная промысловая рыба в водоемах естественного ареала обитания. Очень перспективен в прудовом рыбоводстве вместе с карпом, а также в тепловодном рыбоводстве. Особенно перспективны для рыбоводных целей гибриды (в частности, между белым и пестрым толстолобиками), занимающие промежуточное положение по спектру питания и сохраняющие высокую скорость роста.

Является важным биологическим мелиоратором, очищающим водоем от низших водорослей.



Щука - одна из наиболее широко распространенных пресноводных рыб северного полушария. Населяет озера и медленно текущие реки. Обычно держится в зарослях подводной растительности, быстрого течения избегает. Среди других пресноводных видов рыб щука отличается высокой скоростью роста. Достигает в длину свыше 150 см и массы 35 кг и более.

Половой зрелости щука достигает на 3-4-й год жизни. Нерест проходит во время весеннего половодья, обычно на заливных лугах, чаще всего сразу после вскрытия водоемов ото льда (нередко подо льдом). Икринки слабосклеиваемые, приклеиваются главным образом к растениям. Плодовитость колеблется от 100 тыс. до 1,0 млн. икринок диаметром 2,5-3 мм. В зависимости от температуры развитие эмбрионов продолжается от 7 до 21 суток. При достижении длины 2-4 см молодь щуки начинает хищничать, причем в составе ее пищи встречаются организмы (молодь других видов рыб), масса которых равняется половине и даже более массы хищника.

Щука, как типичный хищник-засадчик, активно истребляет малоценную рыбу на мелководье, практически предпочитающую обитать в центральной более глубокой части водоема. При использовании щуки-мелиоратора молодь карпа (сазана) рекомендуется вселять весной, когда интенсивность питания половозрелой щуки не высокая, а для мелкой щуки в достатке мальков местных рыб.

Имеет важное значение для озерного товарного рыбоводства, как регулятор численности малоценной аборигенной ихтиофауны. Интересный объект спортивного и любительского рыболовства.



Линь - предпочитает держаться в тихих, заросших мягкой подводной растительностью заливах рек, старицах, протоках со слабым течением. Хорошо себя чувствует в озёрах, больших прудах, заросших по берегам камышом, тростником и осокой.

Обычно ведёт одиночный, малоподвижный образ жизни. Держится у дна, среди зарослей, избегая яркого света. Нетребователен к концентрации кислорода в воде, что позволяет ему жить там, где многие другие виды рыб выжить не могут.

Питается донными беспозвоночными (личинками насекомых, червями, моллюсками), добывая их из ила на глубине 7—9 см. Взрослые рыбы кроме животных организмов, поедают водные растения и детрит, которые могут составлять до 60 % рациона.

Половозрелым линь становится в возрасте 3—4 лет. Линь — теплолюбивая рыба, поэтому начинает нереститься в июне — июле при температуре воды 18—20 °С. Плодовитость высокая — 300—400 тыс. икринок.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для правильного функционирования озерно-товарного рыбного хозяйства необходимо провести подготовительные работы по его рыбоустройству. В целях увеличения объема выращивания товарной рыбы в данном водоеме необходимо произвести полный отлов малоценной аборигенной рыбы, которая создает дополнительную нагрузку на кормовую базу водоема и мешает отлову ценных видов. Отлов необходимо произвести в течении первых двух лет разрешенными промысловыми орудиями лова.

Далее, в густых зарослях камыша необходимо прокосить проходы для передвижения рыбы с целью нагула и размножения;

- провести гидрохимический анализ воды для определения содержания в воде жизненно важных химических показателей (кислород, рН, нитраты, нитриты, углекислый газ и др.);

- проводить в зимнее время аэрацию воды, для поддержания концентрации кислорода в воде до 7 мг/л.

Для повышения продуктивности и рентабельности рыбного хозяйства озер необходимо внедрять поликультуры, чтобы полнее и шире использовать имеющиеся в нем кормовые ресурсы. Заселение водоема рыбами, различающимися по характеру питания, способствуют более полному использованию различных звеньев общей пищевой цепи и повышению рыбопродуктивности водоема в целом.

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОЗЕРНО-ТОВАРНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Зарыбление в мае-июне
2. Выращивание товарной рыбы;
3. Нагул двухлеток (апрель-октябрь);
4. Зимовка двухлеток (ноябрь-апрель);
5. Контроль за качеством воды постоянно, усилив в зимний период;
6. Аэрация (ноябрь-март);
7. Мелиоративный облов – постоянно;
8. Выкос растительности – июнь-сентябрь.

Аэрация проводится в зимний период для поддержания в воде концентрации кислорода до 7 мг/л. Для чего по льду пробивается множество лунок, в местах предполагаемого скопления рыбы зимой, куда вставляются пучки камыша. Также используются мотопомпы и механическая аэрационная спецтехника, которая нагнетает в воду кислород. Это самый простой и действенный способ аэрации естественных водоемов.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЫБОВОДНО-МЕЛИОРАТИВНЫМ, ОХРАННЫМ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Основными условиями эффективного использования рыбохозяйственных водоемов, особенно средних и малых, является своевременное выполнение всего комплекса необходимых рыбоводно-мелиоративных и рыбоохранных работ, направленных на создание оптимальных условий обитания рыбного населения и их естественной кормовой базы. Мелиоративный отлов рыбы проводят также в случаях наступления заморных явлений на водоеме с целью предотвращения гибели рыбы.

Зарыбление водоема производителями ценных рыб (их молодь) производят в случаях формирования заново видового состава ихтиофауны или ее улучшения с целью увеличения доли ценных рыб.

Наиболее эффективной мерой при охране рыбных запасов является запрет на рыболовство в периоды размножения рыб.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для стабильного и независимого функционирования озерно-товарного рыбоводного хозяйства необходим ряд производственных мощностей, в том числе:

- холодильное оборудование для хранения замороженной рыбы при температуре – 18 °С, мощностью до 5 тонн;
- рыбоперерабатывающий цех по производству вяленой, копченой рыбы;
- торговые точки, магазины и рынки;
- живорыбные садки и ёмкости для перевозки рыбы;
- цех приготовления комбикорма для рыб;
- мини инкубационный цех по воспроизводству рыбной молоди.

Наличие этих спутников озерно-товарного рыбоводного хозяйства увеличит экономическую эффективность использования рыбных ресурсов, так как сделает хозяйство независимым от природных факторов и от колебания цен на рыбу по сезонам года. Например, рыбу отловленную в весеннее время, когда рыночная стоимость рыбы снижается, можно сохранить в холодильных установках и реализовать при увеличении спроса. Возможность подращивания и кормления личинки позволит проводить зарыбление водоемов в наиболее подходящее время, и не зависеть от сроков выклева личинки.

Возможность переработки рыбной продукции обеспечит увеличение прибыли при реализации и расширит рынок сбыта, так как ассортимент рыбной продукции будет расширен от свежей рыбы до консервов.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ

В результате интенсификации и перехода из рыболовного хозяйства в рыбоводное хозяйство для проведения работ связанных с усилением охраны водоемов, переселением ценных видов рыб, увеличением объемов добычи рыбных ресурсов, а также с созданием дополнительной инфраструктуры потребуется значительное количество технического оснащения и специального оборудования.

12. РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛА

В связи с интенсификацией рыбного хозяйства, увеличатся объемы рыбной продукции, которую необходимо отлавливать. В связи с этим потребуется усиление рыболовного флота и приобретение специализированных орудий лова. Так, при увеличении объемов добычи сиговых, в целях сохранения качества рыбной продукции, необходимо приобрести ставные невода, а для отлова больших объемов карпа, а также для лова сеголеток с целью переселения, необходимы закидные невода. Лов рыбы закидными неводами потребует подготовку тоневого участка и создание рыболовецкой бригады.

13. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОТРХ

В связи с тем, что озерно-товарное рыбоводное хозяйство будет вести интенсивное рыбоводство, с вложением значительных средств, необходимо предусмотреть возможные риски техногенного и природного происхождения:

- отслеживать техническое состояние оборудования, рыболовного транспорта, автотранспорта, своевременно осуществлять ремонт, модернизацию и приобретение;
- отслеживать ситуацию кадрового обеспечения хозяйства (предусмотреть повышение квалификации сотрудников ОТРХ);
- осуществлять проведение научно-исследовательских работ с целью оценки влияния ОТРХ на экосистему водоемов и корректировки норм зарыбления и кормления рыб;
- своевременно осуществлять контроль за эпизоотическим состоянием хозяйства, контролировать заболеваемость рыб.

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По мере возрастания антропогенной нагрузки на экосистему и прогрессирующего стока биогенов в водоемы, ускоряются процессы эвтрофирования. Увеличивается зарастаемость озера погруженной высшей

водной растительностью, которая после отмирания накапливается на дне и заиливается, что затрудняет процесс деструкции органического вещества.

Для предупреждения заболачивания, из водоема необходимо удалить избыток водной растительности, а для предотвращения "цветения" воды – предотвратить вспышку численности фитопланктона. На большой площади техническими средствами сделать такую работу весьма затруднительно. В качестве альтернативы потребление избыточной массы продуцентов возможно специализированными биологическими объектами.

В качестве фитомелиораторов чаще всего используются белый амур и белый толстолобик. Растительноядные рыбы могут, как замедлить, так и ускорить процессы эвтрофирования, поэтому мелиоративные работы с помощью растительноядных рыб нужно проводить очень осторожно, по этапам, тщательно анализируя каждый из них.

Заращаемость мелководных водоемов водной растительностью иногда очень значительна, занимая до 35-40 % и более акватории плеса. Рыбы – фитофаги, наиболее приемлемые для малых и средних озер, великолепно очищают водоемы от водной растительности. Среди них белый амур, вырастающий до 1 м и более и ставший обычным обитателем российских водоемов. Пищу белого амура составляют рдесты, элодея, ряска, а также молодые побеги тростника. Оптимальная температура для питания – около 25-30⁰С, когда амур массой 1 кг съедает за сутки 2 кг растительности.

В последующем, для поддержания положительного эффекта возникнет необходимость в поддержании численности белого амура в соответствии с уровнем развития водной растительности. Поэтому размножения водорослей можно избежать, сдерживая численность молоди мирных рыб и рыб-планктофагов, потребляющих крупный зоопланктон. Эффективными мелиораторами являются хищные виды рыб, например судак, щука, окунь и налим.

При интенсификации рыбоводства для достижения хозяйственных показателей проводятся ряд мелиоративных работ:

Аэрация – насыщение воды кислородом. При работе аэраторов в водоёмах, кроме насыщения воды кислородом, проявляются одновременно эффекты изменения теплового баланса водной среды и перераспределение температуры в слоях мелководных озер. Аэрация малых озер в процессе выращивания рыбы по интенсивной технологии позволяет: снизить или устранить полностью температурные, кислородные и химические различия воды в зоне аэрации; усилить теплообмен воды с атмосферой и верхним слоем донных отложений; ускорить разложение (деструкцию) органического вещества в воде и иле; обеспечить преобладание комплекса зелёных водорослей над сине-зелеными; обеспечить увеличение интенсивности потребления корма рыбами и, следовательно, скорости их роста; повысить самоочистительную способность интенсивно эксплуатируемых рыбоводных водоёмов.

Удаление растительности. Оптимальное развитие водной растительности (макрофитов) является положительным фактором в жизни рыбохозяйственного водоема. Среди растительности развивается обильная рыбная пища. Кроме того, растительность используется фитофильными рыбами для откладки икры. В то же время избыточное развитие макрофитов нежелательно, так как приводит к зарастанию водоема, постепенному превращению его в болото. При сильном развитии водной растительности условия обитания рыб резко ухудшаются: водоем затеняется, слабо прогревается, сокращается площадь нагула рыб, зимой растительная масса, разлагаясь, может привести к дефициту кислорода и замору. Удаление растительности применяется для улучшения обитания выращиваемых рыб. В данном случае удаляется избыточная надводная и подводная растительность.

Жесткую растительность выкашивают либо вручную, либо с помощью камышекосилки. Мягкую водную растительность удаляют специальными буксируемыми граблями или тросами. Грабли представляют собой прямоугольную раму, на нижней части которой расположены в 2-3 ряда зубья длиной 0,2 - 0,5 м для отрыва от грунта и сбора растительности.

Положительно зарекомендовал себя способ удаления мягкой растительности тросом. На крупных водоемах трос забрасывают аналогично закидному неводу, а затем лебедками или мощными тракторами подтягивают к берегу; на небольших водоемах трос могут тянуть два мощных трактора, идущие по противоположным берегам. Подрезанная растительность ветром прибивается к берегу, где ее выволакивают вручную или механизированным способом.

Дноуглубительные работы – проводятся на мелководных участках водоема, с целью увеличения максимальных глубин и как следствие снижения риска зимних заморов. Осуществляются они экскаватором в прибрежной зоне, простым удалением иловых отложений и грунта.

Для поддержания рыбохозяйственного водоема в состоянии соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения от загрязнения и засорения, а также охраны нерестилищ и нагул рыбных ресурсов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования.

Одним, из основных условий эффективного использования рыбохозяйственных водоемов является своевременное выполнение всего комплекса необходимых рыбоводно-мелиоративных и рыбоохранных работ; мелиоративный отлов рыбы, в случаях наступления заморных явлений на водоеме, с целью предотвращения гибели рыбы, охрана от браконьерства, применение запрещенными орудиями лова, также проведение научно-исследовательских работ с целью оценки влияния ОТРХ на экосистему водоемов и корректировки норм зарыбления и кормления рыб и своевременно осуществлять контроль за эпизоотическим состоянием хозяйства, контролировать заболеваемость рыб.

15. ОХРАНА ВОДОЕМА

В результате интенсификации рыбного хозяйства (увеличенная плотность посадки рыбы, наличие ценных видов рыб и т.д.) данный водоем станет привлекательным для браконьерства. В связи с этим, необходимо усилить охрану водоемов, в целях предотвращения ущерба от незаконного лова рыбы и других посягательств со стороны злоумышленников.

Для этих целей необходимо создать егерскую службу, обеспеченную транспортными средствами позволяющими эффективно осуществлять охрану водоемов.

Таблица –7. Оборудование для обеспечения охраны водоемов

Наименование	Статус
Аншлаги	в наличии
Егерская форма	в наличии
Автомашины	в наличии
Снегоход	в наличии
Моторные лодки	в наличии
Рыболовные снасти (лодки, автоцистерны, льдобуры, помпы, сети и невода)	в наличии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статус ОТРХ дает больше самостоятельности хозяйству, стимулирует инициативу, законодательно позволяет проводить различные рыбоводно-мелиоративные работы. Данное обстоятельство позволит направленно формировать качественный и количественный состав ихтиофауны, согласно предпочтениям и конъюнктуре рынка.

Гидрологический режим водоема позволяет осуществлять многолетнее товарное выращивание промысловых видов рыб. По степени минерализации воды в озерах пресная (с минерализацией менее 1 г/дм³), по степени развития кормовой базы водоемы являются средне кормными. Ихтиофауна водных объектов представлена аборигенными видами (карась, линь, ротан), а объектами товарного выращивания будут являться карповые, сиговые, растительноядные виды, щука и др. Состояние естественной кормовой базы позволяет существенно повысить рыбопродуктивность рассматриваемого водоема. Так рыбопродуктивность будет увеличена и для повышения эффективности функционирования хозяйства, необходимо будет провести реконструкцию ихтиофауны. Заменить низкопродуктивные и малоценные виды рыб, на более ценные объекты товарного выращивания в поликультуру. Для достижения расчетных показателей по производству рыбной продукции на водоеме необходимо осуществлять мелиоративные работы (аэрация, удаление излишней растительности, дноуглубительные работы). В состав ОТРХ войдут цеха по воспроизводству, элементы рыбоводства и рыболовства, приготовления кормов для карпа, перерабатывающие цеха (для охлажденной и замороженной продукции) и сеть торговых точек.

Создание ОТРХ рыбного хозяйства на рыбохозяйственном водоеме позволит сделать прибыльным и значительно увеличит объемы производства ценных видов рыб. Будут дополнительно созданы рабочие места. Водоем станет более привлекательным для спортивно-любительского рыболовства и объектом для рыболовного туризма.

Приропользователем на базе вышеуказанных рыбохозяйственных водоемах проведены санитарно-ветеринарные исследования по безопасности воды и рыбы, организована егерская служба по охране водоема. В наличии имеются рыболовный флот, автотранспорт, специальные рыбоводные оборудование и снасти для ловли рыбы.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для достижения наибольшего рыбохозяйственного эффекта на данном водоеме необходимо:

1. Произвести мелиоративный отлов от малоценных видов рыб.
2. Проводить рыбоводные работы - зарыбление осенью сеголетками карпа; растительноядных рыб и реинтродукция взрослых и молоди рыб из близлежащих водоемов (аборигенных видов рыб).

3. В зимний период периодически проводить бурение лунок и закладку прорубей, прикрывать их сверху рогозом и снегом, по возможности аэрировать воду для предотвращения заморных явлений.
4. Места нереста на мелководьях с зарослями погруженной растительности необходимо очищать от мусора, прошлогодней травы и дезинфицировать негашеной известью.
5. Два раза в месяц проводить контрольные отловы рыбы для определения их упитанности, темпов роста и относительной численности.
6. В период промысла использовать селективные способы лова, применяя наборы разноячеистых сетей.
7. Рекомендуются усилить охрану водоема и не допускать браконьерского промысла.
8. Строго соблюдать санитарные нормы и проводить профилактические мероприятия по предотвращению заболеваемости рыб.
10. Содержать в исправном состоянии техническое оборудование, рыболовного транспорта, автотранспорта, своевременно осуществлять их ремонт и приобретение;
11. Систематически проводить научно-исследовательские работы с целью оценки влияния ОТРХ на экосистему водоема и корректировки норм зарыбления и кормления рыб;
12. Своевременно осуществлять контроль за эпизоотическим состоянием хозяйства, контролировать заболеваемость рыб.

ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИХТИОФАУНЫ ПО ВИДАМ

Таблица 8. Линейный и весовой рост карпа

Показатели	Возраст		
	3+	4+	5+
Длина, см	26,7	30,4	32,5
Колебания	27,7-32,4	30,1-33,6	31,6-34,5
Масса, г	680	835	1126

Таблица 9. Размерная и весовая структура популяции серебряного караса

Возрастной ряд	Длина, см (мин-макс)	Средняя длина, см	Масса, г (мин-макс)	Средняя масса, г
2+	10,2-13,1	12	32,5-57,3	44,6
3+	13,5-14,8	14	78,0-112,2	98,8
4+	15,0-17,1	16	115,0-150,1	130
5+	17,5-25,5	22	158,0-173,2	163

Таблица 10. Основные биологические показатели щуки

Возрастной ряд	Длина, см (мин-макс)	Средняя длина, см	Масса, г (мин-макс)	Средняя масса, г
1+	-	26,4	-	169
3+	-	39,7	-	521
4+	47,1-49,9	48,50	924-1132	1028

Таблица 11. Основные биологические показатели линя

Возрастной ряд	Длина, см (мин-макс)	Средняя длина, см	Масса, г (мин-макс)	Средняя масса, г
2+	8,4-12,2	10,2	21-58	37,2
3+	11,6-15,8	13,5	50-124	79,4
4+	15,6-17,4	16,3	116-164	135,4

Таблица 12. Основные биологические показатели пеляди

Возрастной ряд	Длина, см (мин-макс)	Средняя длина, см	Масса, г (мин-макс)	Средняя масса, г
0+	17,5-19,6	18,5	102-146	124
1+	24,9-26,5	23,5	317-382	349,5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Краткие методические указания по выполнению исследований с целью определения биологической продуктивности озер. – Тюмень, 1971. – С.11.
2. Методические рекомендации по сбору и обработке материала при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. – Л., 1984.
3. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. – Л., 1983. – 50 с.
4. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л.: Гидрометеиздат, 1983.-239 с.
5. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Orthocladinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae). – Л., 1970. – 344 с.
6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
- 7 Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. - М., 1959.-165 с.
8. Рыбы Казахстан: в 5 томах. – Алма-Ата: Наука, 1987. –Т.2 – 200 с.
9. Рыбы Казахстан: в 5 томах. – Алма-Ата: Наука, 1988. –Т.3 – 304 с.
10. Рыбы Казахстан: в 5 томах. – Алма-Ата: Наука, 1989. –Т.4 – 312 с.
11. Кушнаренок А.И., Лугарев Е.С. Оценка численности рыб по уловам пассивными орудиями лова// Вопросы ихтиологии. – М., 1989. – Т. 23. –Вып. 6. – С. 921-926.
12. Трещев А.И. Интенсивность рыболовства. – М., 1983. – 108 с.
13. Филоненко П.П. Омаров Т.Р. Озера Северного, Западного и Восточного Казахстана (справочник). – М.: Гидрометеиздат, 1974. - 78 с.
14. Даирбаев М., Бирмагамбетов А., Рыбохозяйственная бонитировка водоемов Северо-Казахстанской и Кокчетавской областей / Отчет о НИР КазНИИРХ / - Алма-Ата, 1964. – 242 с.
15. Лысенко Н.Ф., Сироткин М.Н., Фокина А.С., Григорьева Э.Н. Пути повышения рыбопродуктивности озер в разных климатических зонах Республики Казахстан. Раздел: Кокчетавская область / Отчет о НИР КазНИИРХ / Балхаш, 1970. – 288 с.
16. Дукравец Г.М. и др. Разработка биологического обоснования для организации озерно-товарных хозяйств в Казахстане. Раздел: Озера Северного Казахстана / Отчет о НИР КазНИИРХ / - Алма-Ата, 1973. – 131 с.
17. Сечной Г.М. и др. Разработка биотехники товарного рыбоводства в водоемах северных областей Казахстана. Раздел: Озера Северо-Казахстанской и Кокчетавской областей / Отчет о НИР КазНИИРХ / - Балхаш, 1978. – 151 с.
18. Горюнова А.И. и др. Разработка нормативов по биотехнике выращивания ценных видов рыб в Иммантауском озерно-товарном хозяйстве / Отчет о НИР КазНИИРХ / - Алма-Ата, 1979. – 254 с.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации

г. Нур-Султан

« 15 » января 20 21 г.

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке»

Товарищество с ограниченной ответственностью

(наименование юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) физического лица)

«AREKET-2050»

аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности сроком на пять лет. Свидетельство предоставляется для принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета, средств недропользователей Республики Казахстан.

Уполномоченный орган

М.П.



А. Есмаканова

Срок действия свидетельства об аккредитации до 15 января 2026 года

Серия МК

№ 000014